




Weill Cornell Medicine

Esto es lo que sabemos: Calendario de vacunación por grupo de edad



¿Quiere proteger su salud y la de sus seres queridos? Manténgase al día con sus vacunas.



0-24 Horas

Hepatitis B al nacer

1^a dosis



4 Meses

DTaP

2^a dosis

Hib

2^a dosis

VPI

2^a dosis


PCV

2^a dosis

Rotavirus

2^a dosis

(Dependiendo de la marca, puede ser la dosis final.)



1-2 Meses

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP)

1^a dosis

Haemophilus influenzae tipo b (Hib)

1^a dosis

Hepatitis B

2^a dosis

Vacuna antipoliomielítica inactivada (VPI)

1^a dosis

Vacuna antineumocócica (PCV)

1^a dosis

Rotavirus

1^a dosis



1-2 Años

Varicela

1^a dosis

DTaP

4th dose

Hepatitis A

1^a dosis

Hepatitis B (última dosis (a los 18 meses, si aún no se ha administrado)

3^a dosis

Hib (dependiendo de la marca, puede ser la tercera y última dosis)

4^a dosis

VPI

3^a dosis

(a los 18 meses, si aún no se ha administrado)

Sarampión, paperas y rubéola (MMR)

1^a dosis

PCV (última dosis)

4^a dosis



6 Meses

DTaP

3^a dosis

Hib

3^a dosis

Hepatitis B (dosis final)

3^a dosis

VPI

3^a dosis

PCV

3^a dosis

Rotavirus (si es necesaria)

3^a dosis

Además, los bebés de hasta 8 meses deben recibir la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) si es su primera temporada de VRS (de otoño a primavera).



4-6 Años

Varicela

2^a dosis

DTaP (dosis final)

5^a dosis

VPI (dosis final)

4^a dosis

MMR (dosis final)

2^a dosis



11-12 Años

Virus del papiloma humano (VPH) (administradas con un intervalo de seis meses a un año)

1^a y 2^a

Vacuna antimeningocócica (MenACWY)

1^a dosis

Tdap (Refuerzo DTaP)

Refuerzo



13-18 Años

Aplicar vacunas que no se hayan administrado

MenACWY (dosis final)

2^a dosis

Meningocócica B (MenB)

(dos dosis para adolescentes con alto riesgo de meningitis meningocócica)

1^a dosis



50+ Años

Vacuna contra el VRS

(a los 75 años o a partir de los 50 para personas con alto riesgo)

Una dosis

Vacuna contra la culebrilla

Dos dosis

Tétanos y difteria (Td)

(Una cada 10 años)

Refuerzo



Cada año

A partir de los 6 meses, la vacuna anual contra la influenza (gripe) brinda protección durante toda la vida.

Visite weillcornell.org/doctors para encontrar o programar una cita con un médico u otro especialista de la salud.

Esto es lo que sabemos